

**Таиланд, 24/01-05/02/2016**

**Светлана Баскакова и Полина Шакула,  
Казахстан**

24/01: Бангкок

25/01: Чумпхон (Южный Таиланд)

26/01: Чумпхон (Южный Таиланд)

27/01: Чумпхон – о. Ко Тао (Мае Хаед, Хин Вонг Бай, Сайре Хат, Сайре Бич)

28/01: о. Ко Тао (Сайре Хат, Сайре Бич)

29/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич)

30/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, поход через джунгли острова к Манго Бай, обратно по морю в Мае Хаед)

31/01: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич)

01/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, поход через джунгли острова к Таноте Бай, обратно на такси)

02/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич)


03/02: о. Ко Тао (Симпл Лайф, Сайре Бич, Мае Хаед) - Чумпхон

04/02: Бангкок


05/02: Бангкок/аэропорт

**GALLIFORMES: Phasianidae**

1	Red Junglefowl <i>Gallus gallus</i> <b>Банкивская джунглевая курица</b>		Домашник петухи содержатся в переставляемых плетеных клетках без дна или на свободном выгуле - повсеместно от Банкока и Чумпхона до о.Тао. В окраске преобладают красные или черные тона, на высоких мускулистых ногах, бойцового облика.
2	Green Peafowl <i>Pavo muticus</i> <b>Зеленый павлин</b>		Содержится местными жителями. Слышали голос у причала в Чумпхоне - 27/01. Большая связка хвостовых перьев продается в Банкоке на сувениры - 04/02.
<b>CICONIIFORMES: Ciconiidae</b>			
3	Asian Openbill <i>Anastomus oscitans</i> <b>Индийский аист-разиня</b>		1 отмечен летящим на Бангкоком 24/01, два - 4/02. В полете длинная вытянутая белая шея, передняя часть крыла белая, задняя – темная.
<b>PELECANIFORMES: Ardeidae</b>			
4	Gray Heron <i>Ardea cinerea</i> <b>Серая цапля</b>		24/01- 1 летящая особь, над прудами, Бангкок.
5	Great Egret <i>Ardea alba</i> <b>Большая белая цапля</b>		Встречена в Бангкоке 24/01 – 1 особь. Минимум 6 особей отмечены на 3 км в устье крупной судоходной реки Пхананг Так, впадающей в Сиамский залив напротив г. Чумпхон 27/01, одна летящая особь отмечена на Ко Тао (Сайре Бич) - 02/02 (вся белая, черные ноги, клюв, сложенная шея).

6	<p>Little Egret <i>Egretta garzetta</i> <b>Малая белая цапля</b></p>		<p>26/01- 1 особь отмечена в городском парке г. Чумпхон, 27/01- минимум 2 особи на 3 км в устье крупной судоходной реки Пхананг Так, впадающей в Сиамский залив напротив г. Чумпхон. 04/02 – 1 особь на канале в Бангкоке.</p>
7	<p>Pacific Reef-Heron <i>Egretta sacra</i> <b>Восточная рифовая цапля</b></p>		<p>В небольшом количестве отмечалась на Ко Тао практически ежедневно - с 27/01 по 03/02: Хин Вонг Бай, Сайре Бич, Манго Бай, Мае Хаед. Садится на лодки, портовые сооружения, плавающий мусор, деревья. Вся сверху-снизу темно-серая, со сложенной шеей, размером с ббц.</p>
8	<p>Eastern Cattle Egret <i>Bubuculus ibis (coromandus)</i> <b>Египетская цапля</b></p>		<p>Одиночная особь отмечена 24/01 среди болотистой местности г. Бангкока, 30/01 - 1 особь на о.Ко Тао (Сайре бич). Короткая, кургузая, вся белая, с закругленными крыльями, шея сложена.</p>

9	<p>Chinese Pond-Heron  <i>Ardeola bacchus</i>  <b>Белокрылая цапля</b>  <b>(китайская прудовая)</b></p>		<p>Отмечалась на побережье в районе г. Чумпхон, оказалась обычным зимующим видом на острове Ко Тао. 31/01: длинная вдоль крупно-полосатая шея, как и грудь. Ровно-серые крылья, в полете – белые, широкие, закругленные. Спина в полете темно-серая. Клюв мощный, по смыканию - желтый, желтый глаз, от глаза к клюву - желтоватая полоса. Ноги зеленоватые. Горло белое, трепещет при полуоткрытом клюве от жары. Кормится, выбирая что-то в траве, недалеко от Сайре Бич, 2 особи держатся вместе. 01/02: утром 2 особи греются на вершинах пальм на листьях. Штаны и низ брюха белые.</p>
<b>ACCIPITRIFORMES: Accipitridae</b>			
10	<p>Chinese Sparrowhawk  <i>Accipiter soloensis</i>  <b>Короткопалый (китайский)</b>  <b>перепелятник</b></p>	<p>В массе зимует на о. Ко Тау. Одиночные особи отмечались повсеместно: в Хин Вонг, в Сайре (обычен, ежедневно, 30/01 преследуется двумя священными майнами), в Манго Бай: 30/01 - красновато-бурая грудь, зоб, брюхо светлее, крылья, хвост поперечно-полосатые. Типичный перепелятник: весь поперечно-полосатый, светлый, по концу хвоста – темная полоса шире.</p>	

11	Brahminy Kite <i>Haliastur indus</i> <b>Браминский коршун</b>	Отмечен 01/02 по дороге в Таноте Бай: в полете в серых тонах, блестит светлый клюв, длинный хвост, нечетко-темное пятно в задней части крыла ближе к туловищу. Другая особь здесь же: поперечно-полосатый снизу, черные заостренные концы крыльев. В полете типа и размера с тетеревятника, сидящий реже-ровно-бурый сверху	
12	White-bellied Sea-Eagle <i>Haliaeetus leucogaster</i> <b>Белобрюхий орлан</b>		Регулярно отмечался на побережье Ко Тао: Сайре (28/01, 02/02), Манго Бай (30/01). Похож на стервятника, примерно такого же размера, передняя сторона крыла белая, задняя – темней (широкая черная полоса по заднему краю крыла), хвост клиновидный. Белое туловище, длинная светлая шея, белая поясница.
<b>CHARADRIIFORMES: Recurvirostridae</b>			
13	Black-winged Stilt <i>Himantopus himantopus</i> <b>Ходулочник</b>	Несколько особей отмечены на берегах прудов в г. Бангкоке 24/01.	
<b>CHARADRIIFORMES: Laridae</b>			
03/02 отмечены над открытым морем в Сиамском заливе: минимум 2 особи крачка или чайка sp. – темные сверху узкие крылья, белесый зад снизу; и другая – некрупная (для чайки), крылья очень узкие, острые, бурые сверху, тело белое.			

**COLUMBIFORMES: Columbidae**

14

Rock Pigeon  
*Columba livia*  
**Сизый голубь**




Обычный вид в городах (Бангкок, Чумпхон) и портах. 03/02 3 особи клюют что-то из песка и хватают что-то в полосе прибоя - Мае Хаед.


15

Spotted Dove  
*Streptopelia chinensis*  
**Пятнистая горлица**



Обычна – Чумпхон, Ко Тао. По сложению напоминает малую, но темнее, с большой областью черно-жемчужного на шее, эта область смыкается сзади шеи. Молодая (Чумпхон, 26/01) – без этих пятен на шее. Два белых пятна по бокам заднего края крыла. Воркуют минимум две – утром 28/01 – Сайре Хат. Воркование напоминает таковое кольчатой горлицы (чекушку), только чуть длиннее и слегка с журчанием.

16	<p>Zebra Dove <i>Geopelia striata</i> <b>Полосатая горлица</b></p>		<p>Отмечена в г. Бангкоке 24/01 (2 особи), 04/02 (обычна, одна собирает ветки для гнезда). Чешуйчатая сверху, вдвое меньше малой горлицы, подпускает на 1 м. Обычный городской вид.</p>
17	<p>Nicobar Pigeon <i>Caloenas nicobarica</i> <b>Гривистый голубь</b></p>	<p>Несколько особей содержатся в вольере на о. Ко Тао совместно с двуцветным плодоядным голубем. Темно-зеленые, очень крупные пузатые голуби с косицами на шее, как у петуха. 30/01</p>	
18	<p>Green Imperial-Pigeon <i>Ducula aenea</i> <b>Мускатный плодоядный голубь</b></p>	<p>Минимум 4 особи с шумом взлетели в кронах деревьев по дороге на Манго Бай 30/01. Крупные; длинная серая шея и голова. Крылья серо-темно-зеленые, начиная от плечей. Возможно, один голубь - на Манго Бай: 30/01, два голубя этого же вида отмечены по дороге на Таноте Бай 01/02 (в полете белая поясница; крупные, слетели с шумом высоко в кронах). <i>Ducula badia</i>?</p>	
19	<p>Pied Imperial-Pigeon <i>Ducula bicolor</i> <b>Двуцветный плодоядный голубь</b></p>	<p>Несколько особей содержатся в вольере на о. Ко Тао совместно с гривистым голубем. Белые голуби с черной полосой по наружному краю крыла во второй его половине ближе к хвосту. 30/01</p>	
<b>CUCULIFORMES: Cuculidae</b>			
20	<p>Banded Bay Cuckoo <i>Sacomantis sonneratii</i> <b>Щетинистая кукушка Зоннерата</b></p>	<p>Вся в крапинку, крап поперечно-ориентирован в частые полосы, с длинным хвостом, на морде вдоль сбоку две продольные белые полосы, 28/01 Сайре Хат.</p>	

21	<p>Greater Coucal <i>Centropus sinensis</i> <b>Большая шпорцевая кукушка</b></p>		<p>Отмечен в г. Чумпхон: 25/01 – в кроне дерева во дворе гостиницы, на о. Ко Тао – в зоне курорта и в глубине острова: 30/01. Большая, толстая; размером и комплекцией как толстая сорока. Длинный широкий черный хвост, тело бурое сверху. Черная голова, зоб, грудь. Все крыло кирпичного цвета, клюв большой, черный, как у сороки. Медлительная, перелазит по веткам дерева. Глухо ухает, как в трубу, звук похож на удода.</p>
<b>APODIFORMES: Apodidae</b>			
22	<p>Edible-nest Swiftlet <i>Aerodramus fuciphagus</i> <b>Салангана-водослед</b> или <i>Aerodramus germani</i> <b>Салангана Германа</b></p>	<p>27/01 – летают над причалом в Чумпхоне: не таким серпом крылья – более прямые; буроватые в целом, подхвостье светлое, хвост с небольшой округлой вилочкой, крылья широковатые, кончаются не остро. Этот же вид летает над городом Чумпхоном – бурые, хвост кажется короче, чем у черного. Не свистят.</p>	
23	<p>House Swift <i>Apus nepalensis</i> <b>Домовой стриж</b></p>	<p>Летают стаями в Бангкоке над храмом Золотого Будды – 24/01, похожи на черных стрижей. 29/01 – минимум 6 особей летают над Сайре Бич. Бурые снизу; хвост кончается тупо, без вилочки; широковатые тупые крылья, пьют воду(?) из моря на лету. У одного точно белая поясица, хвост кончается тупо. 30/01: минимум 10 особей летают над грунтовой дорогой при спуске к Манго Бай.</p>	



**CORACIIFORMES: Coraciidae**

24

Dollarbird  
*Eurystomus orientalis*  
**Широкорот**



Минимум 3 особи по 1 сидящие на верхушках обломанных пальм днем в самую жару (11:15) во время похода на Таноте Бай. Бурая голова, слегка квадратная, топорщится; ярко-красный широкий клюв, крылья темно-иссиня-изумрудные; размером со скворца; ноги красные.


**PSITTACIFORMES: Psittacidae**

25

*Aratinga solstitialis*  
**Солнечная аратинга**



Одна особь держалась в кроне бобового дерева, расщепляя стручки, 25-26/01 - Чумпхон во дворе местного любителя птиц. Возможно, на полувольном содержании или сбежавшая. Происходит из Южной Америки (Бразилия, Венесуэла). Крупный, плотного сложения, больше сороки красно-желтый попугай. Голова оранжевая, цвет плавно переходит в желтое тело, отчего весь перед неровно-оранжевый, крылья книзу становятся с зелеными пятнами, концы их зеленые, хвост длинный, ступенчатый. Голос резкий, отрывистый, попугайный.

<b>PASSERIFORMES: Oriolidae</b>		
26	Black-naped Oriole <i>Oriolus chinensis</i> <b>Китайская иволга</b>	Ежедневно отмечалась визуально и по голосу в деревьях в Сайре-вилладж, в Сайре Хат, над пляжем Сайре: от 1 до 3 особей вместе. Ярко-желтая, с черным крылом, голос как у обыкновенной. 04/02 – в Бангкоке.
<b>PASSERIFORMES: Corvidae</b>		
27	Large-billed Crow <i>Corvus macrorhynchos</i> <b>Большеклювая ворона</b>	Обычная городская птица в Бангкоке, по 1-3 на улицах города: 04/02.
<b>PASSERIFORMES: Hirundinidae</b>		
28	Barn Swallow <i>Hirundo rustica</i> <b>Деревенская ласточка</b>	Отмечена в Бангкоке 24/01, Чумпхоне 26/01. Отмечались ежедневно в стаях на о. Ко Тао: над Сайре Бич. Хвост вилочкой, бурое горло. Касаются на лету поверхности моря (пьют?). 03/02: 16 особей над Сайре Бич.
<b>PASSERIFORMES: Pycnonotidae</b>		
29	Flavescent Bulbul <i>Pictonotus flavescens</i> <b>Желтощекий бюль-бюль</b>	Две серо-бурые сверху, размером со скворца, низ слегка желтоватый, повадки как у дроздов, прячутся в густых подстриженных кустах возле Золотой Горы, Бангкок, 04/02/2016.
30	Yellow-vented Bulbul <i>Pictonotus goiavier</i> <b>Желтобрюхий бюль-бюль</b>	 <p>Чумпон, 25-26/01 – несколько особей (минимум 2) во дворе гостиницы. Поет, лазит в кустах, садится на опору бетонного забора. Глаз в черном ободке, щека серая, спина бурая, на голове бурый хохол, подхвостье желтое, яркое. Верх головы вдоль-черный.</p>

31	Red-whiskered Bulbul <i>Pycnonotus jocosus</i> <b>Краснощекий бюль-бюль</b>	Содержится в клетках местными жителями – г. Чумпхон (26/01), о. Ко Тао (27/01). Продолговатая птица, с острым черным хохлом, ярко-красное пятно за глазом, щека ярко-белая, верх темный, почти черный
<b>PASSERIFORMES: Phylloscopidae</b>		
32	Yellow-browed Warbler <i>Phylloscopus inornatus</i> <b>Пеночка-зарничка</b>	30/01- 03/02: на о. Ко Тао повсеместно раздается циканье: в горах по дороге на Манго Бай, на пляже, в саду на Ко Тау, в массе. Чаще слышится голос из кустов, изредка визуально (01/02): длинная пеночка, очень длинная светлая бровь далеко продолжается за глаз до самого затылка, две отчетливые полосы по крылу, нижняя – особенно четкая и длинная. Общий окрас - бурый, низ неровно-серый, ноги черные, глаз черный. Журчит. 01/02 - Таноте Бай: песня как укороченная песня зеленой пеночки, несколько раз за день, в разных местах. 02/02: целый день чувиканье в прибрежных деревьях Сайре Бич.
<b>PASSERIFORMES: Leiothrichidae</b>		
33	White-crested Laughingthrush <i>Garrulax leucolophus</i> <b>Белохохлая тимелия</b>	Содержится в клетке, Чумпхон 25-26/01. Белая голова с высоким хохлом, глаз в черной полосе, идущей к клюву и за глаз. Зашеек серый, спина, крылья коричневые.
<b>PASSERIFORMES: Muscicapidae</b>		
34	Oriental Magpie Robin <i>Copsychus saularis</i> <b>Сорочий шама-дрозд</b>	 <p>Обычен в Бангкоке, в т.ч. самка с кормом – 24/01; пара в г. Чумпхон во дворе гостиницы 25-26/01. Больше трясогузки, хотя похож по силуэту, только хвостом не трясет, а задирает его кверху. Размером с сорокопута или чуть больше. Белое продолговатое пятно на сгибе крыла на плече, по внутренней (к спине) стороне крыла. Нежная свистящая песня, похожая на обыкновенную чечевицу – мелодичный короткий свист.</p>

35	White-rumped Shama <i>Copsichus (Kittacincla) malabaricus</i> <b>Белопоясничный шама-дрозд</b>	Несколько птиц содержатся в клетке в Мае Хаед – 30/01. Голова, узкий длинный клюв, глаз, горло, зоб и весь верх – черные, брюхо оранжевое. Низ хвоста белый, хвост длиннее тела, узкий.	
<b>PASSERIFORMES: Sturnidae</b>			
36	Asian Glossy Starling <i>Aplonis panayensis</i> <b>Азиатский блестящий скворец</b>		Одна особь отмечена на проводах среди строений в г. Чумпхон 26/01. Иссиня-черный, длинный, размером чуть больше скворца. Красный глаз.
37	Common Hill Myna <i>Gracula religiosa</i> <b>Священная майна</b>		Содержится в клетках: Чумпхон, Ко Тао, разговаривает. Отмечена и на свободе – Сайре вилладж: 30/01 (две майны преследуют китайского перепелятника), на Манго Бай 01/02 (две майны летят вместе, с криком). Вся черная, размером с галку/сойку или больше, два ярко-желтых пятно по бокам зашейка.

38	Great Myna <i>Acridotheris grandis</i> <b>Большая майна</b>		Чумпхон – 1 особь, 25/01. Вся черная, клюв, лапы – оранжево-желтые, белая узкая полоса по наружному краю сложенного крыла, большое белое пятно на крыле в полете. Хохол на голове. Хвост белый по заднему краю, белое подхвостье.
39	Common Myna <i>Acridotheris tristis</i> <b>Обыкновенная майна</b>		Отмечена повсеместно: в г. Бангкок, где обычна, но немногочисленна, в г. Чумпхон и на о. Ко Тао (Сайре, Таноте), где подпускает на пляже на 1 м. Придерживаются пар.
40	White-cheeked Starling <i>Sturnus cineraceus</i> <b>Серый скворец</b>	Чумпхон – 1 особь, 26/01. Узкий, мелкий. Едва заметный крап по верху, верх темный, почти черный, низ светлый, клюв ярко-красный, белое пятно на щеке.	
<b>PASSERIFORMES: Dicaeidae</b>			
41	Yellow-bellied Flowerpecker <i>Dicaeum melanozanthum</i> <b>Желтобрюхий цветосос</b>	Одна особь в манграх в порту г.Чумпхон 25/01. Маленькая птица чижового телосложения: голова, горло, грудь, спина – черные, брюхо – желтое. Звонко, очень громко пикает.	

<b>PASSERIFORMES: Motacillidae</b>		
42	Gray Wagtail <i>Motacilla cinerea</i> <b>Горная трясогузка</b>	1 особь сделала круг над морем и скрылась в деревьях 03/02 Сайре Бич.
<b>PASSERIFORMES: Passeridae</b>		
43	House Sparrow <i>Passer domesticus</i> <b>Домовый воробей</b>	Обычен в Бангкоке 24/01, образует совместные стайки (3-5 особей) с полевым воробьем.
44	Eurasian Tree Sparrow <i>Passer montanus</i> <b>Полевой воробей</b>	Обычен повсеместно в городском ландшафте: в Чумпхоне – 25-26/01, в Бангкоке – 24/01, 04/02 (совместно с домовым воробьем).
<b>PASSERIFORMES: Estrildidae</b>		
45	Nutmeg Mannikin <i>Lonchura punctulata</i> <b>Чешуйчатогрудая амадина</b>	Продается за 100 бат для выпуска возле буддийских храмов в Бангкоке – у Золотого Будды, у “Граненого” храма.